

LA BLATTE AMERICAINE

ORDRE : blattoptères

FAMILLE :

ESPECES : Blattes américaines



DENOMINATION	Blatte américaine ou Cancrelat.
CARACTERISTIQUES	Long : de 30 à 40mm. Couleur du roux ferrugineux à marron. Une bande jaunâtre sur le bord du thorax. Ailes plus longues que le corps.
HABITUDES, HABITAT	Recoins sombres, chauds et très humides : animaleries, égouts, gaines de vide-ordures. Recherche la chaleur humide avec des résidus moisissus. Active dans les endroits sombres.
DUREE DE VIE DE L'ADULTE	De 6 à 10 mois.
REGIME ALIMENTAIRE DE L'ADULTE	Se nourrit de toute matière organique avec une préférence pour les produits moisissus y compris les crottes des autres animaux.
FECONDITE	De 7 à 12 oothèques/femelle - de 20 à 28 oeufs/oothèques.
DEVELOPPEMENT LARVAIRE	Environ 10 mois.
REGIME ALIMENTAIRE DES LARVES	Même nourriture que les adultes.
CYCLE DE DEVELOPPEMENT	De 10 à 12 mois.
DEGATS SUR MATERIELS	Grignote les emballages minces en papier ou en plastique. Tâches sur emballages avec les déjections.
RISQUES SANTE ANIMALE ET HUMAINE	Vecteur de moisissures, de bactéries, de virus et de certains vers intestinaux responsables de certaines maladies.